

Tableau de bord des points clefs

OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER	
La claque dans le dos doit être donnée:	
<ul style="list-style-type: none"> + entre les deux omoplates + avec le talon de la main ouverte + de façon vigoureuse 	
La compression abdominale chez l'adulte ou l'enfant (plus de 1 an) doit être :	
<ul style="list-style-type: none"> + au creux de l'estomac + sans appuyer sur les côtes + vers l'arrière et vers le 	
Les compressions thoraciques chez l'adulte obèse ou la femme enceinte doivent être :	
<ul style="list-style-type: none"> + au milieu du sternum + sans appuyer sur les côtes + vers l'arrière 	
Les compressions thoraciques chez le nourrisson doivent être :	
<ul style="list-style-type: none"> + pratiquées au milieu de la poitrine + profondes 	
HÉMORRAGIES EXTERNES	
La compression locale doit être :	
<ul style="list-style-type: none"> + suffisante pour arrêter le saignement + permanente 	
PERTE DE CONNAISSANCE	
La liberté des voies aériennes est assurée lorsque :	
<ul style="list-style-type: none"> + le menton est élevé + la tête est maintenue dans cette position 	
La mise en position latérale de sécurité doit :	
<ul style="list-style-type: none"> + limiter au maximum les mouvements de la colonne vertébrale + n'occasionner aucune pression sur la poitrine + aboutir à une position stable, la plus latérale possible + permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur (bouche ouverte) 	
ARRÊT CARDIAQUE	
Les compressions thoraciques doivent :	
<ul style="list-style-type: none"> + comprimer fortement le sternum + avoir une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute 	
Les deux insufflations doivent :	
<ul style="list-style-type: none"> + être lentes et progressives + cesser dès le début de soulèvement de la poitrine + être réalisées en 5 secondes au 	
La mise en œuvre du défibrillateur doit :	
<ul style="list-style-type: none"> + être la plus précoce possible + interrompre le moins possible la pratique des compressions thoraciques 	

